

EBOLA

DESCOBERTA EM 1976 ÀS MARGENS DO RIO EBOLA NA ÁFRICA, É UMA DOENÇA ALTAMENTE INFECCIOSA, CAUSADA POR UM VÍRUS. TORNA-SE TRANSMISSÍVEL APENAS A PARTIR DO APARECIMENTO DOS PRIMEIROS SINTOMAS. É TRANSMISSÍVEL POR CONTATO DIRETO COM ROUPAS, SANGUE OU FLUIDOS CORPORAIS DE PESSOAS E ANIMAIS CONTAMINADOS. NÃO EXISTE TRATAMENTO ESPECÍFICO, PORÉM MEDIDAS DE SUPORTE INTENSIVO E O ISOLAMENTO DO PACIENTE PODEM SER ADOTADOS. A CHANCE DE SOBREVIVÊNCIA AUMENTA SE O DOENTE PROCURAR AUXÍLIO MÉDICO IMEDIATAMENTE APÓS O APARECIMENTO DOS PRIMEIROS SINTOMAS.

NÃO EXISTE VACINA OU CURA CONHECIDA

DISSEMINAÇÃO IMPROVÁVEL PARA OUTROS CONTINENTES

VIAJANTES PROVENIENTES DE PAÍSES COM TRANSMISSÃO ESTÃO SUJEITOS A NORMAS DA O.M.S QUE VISAM PROTEGER OUTROS PASSAGEIROS.

3700 CRIANÇAS JÁ FICARAM ÓRFANS DESDE O INÍCIO DO SURTO DE 2014, O MAIS GRAVE REGISTRADO

PREVENÇÃO E MEDIDAS

- ISOLAMENTO DO DOENTE EM QUARTO PRIVATIVO;
- UTILIZAÇÃO DE MATERIAL EXCLUSIVO PARA O PACIENTE;
- LAVAR FREQUENTEMENTE AS MÃOS COM SABÃO E LIMPAR AS SUPERFÍCIES E OBJETOS DO QUARTO DO DOENTE;
- EVITAR CONTATO COM SANGUE, ROUPAS E FLUIDOS DE DOENTES;
- USAR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: MÁSCARAS, PROTEÇÃO FACIAL, JALECOS DE MANGA COMPRIDA, LUVAS E AVENTAIS RESISTENTES A FLUIDOS OU IMPERMEÁVEIS.

TRANSMISSÃO

OCORRE POR **CONTATO DIRETO** COM SANGUE, SUOR, SALIVA, SÊMEN E LÁGRIMAS DE PESSOAS E ANIMAIS INFECTADOS. ACREDITA-SE QUE O PRIMEIRO PORTADOR FOI O MORCEGO QUE CONTAMINOU MACACOS, PORCO-ESPINHOS E ANTÍLOPES.



MORCEGO



MACACO



PORCO-ESPINHO



ANTÍLOPE



HUMANO

VÔMITO

DIARRÉIA

SANGRAMENTO INTERNO E EXTERNO

COMPLICAÇÕES NOS RINS E NO FÍGADO

SINTOMAS

- PRIMEIRA FASE
- SEGUNDA FASE

DOR DE CABEÇA

FEBRE SÚBITA

DOR DE GARGANTA

MANCHAS VERMELHAS NA PELE

PERÍODO DE INCUBAÇÃO 1 A 21 DIAS

90% É A TAXA DE MORTALIDADE



Produção



© 2014 TelesSaúde UERJ. Todos os Direitos Reservados.

FONTE: ANV